

Molusco Contagioso

Infecção limitada à pele causada pelo vírus *Molluscum contagiosum*. É transmitida no contacto pele com pele e é frequente nas crianças. Nos adultos, no entanto, é na maioria dos casos uma infecção sexualmente transmissível (IST).

Aspecto clínico: Pápulas firmes e umbilicadas (únicas ou múltiplas), de cor rosada ou branco pérola.

Localização:

- Disseminada pelo corpo;
- Região anogenital;



Contágio:

- Contacto directo/intimo;
- Através da roupa interior, toalhas ou objectos íntimos (ex.: lâmina barbear; esponjas).

Período de incubação: 14-50 dias.

IMPORTANTE

- Deve consultar o seu médico para:
 - confirmar o diagnóstico;
 - ser medicado;
 - realizar o rastreio das outras IST (no adulto).
- O uso do preservativo não previne a transmissão desta doença, pelo que deve evitar o contacto sexual até terminar o tratamento;
- Deve enviar os parceiros sexuais para tratamento e rastreio de IST.

Duração da infecção: Auto-limitada (6 meses- 4 anos), mas deve ser tratada para as lesões não se espalharem e infectarem outras pessoas.

Os Imunocomprometidos (ex.: VIH+): As lesões podem ser maiores e serem um sinal de alerta para deterioração do sistema imune.

Deve evitar:

- Contacto directo pele com pele contaminada
- Partilhar roupa ou objectos íntimos; barbear/ depilar áreas com lesões.

Após o tratamento:

- Podem observar-se pequenas cicatrizes ou manchas no local do tratamento.
- Podem surgir novas lesões após o tratamento, que devem ser tratadas.