



## Infeção genital por Clamídia

É uma infeção bacteriana de transmissão sexual, causada pela *Chlamydia trachomatis*.

### Contágio:

É transmitida por uma pessoa que esteja infetada através de sexo vaginal, oral ou anal. É mais frequente em pessoas jovens, em quem tem múltiplos parceiros sexuais e não usa preservativo. Se já teve no passado esta infeção, pode ser novamente contagiada.

### Proteção

Sexo sempre com preservativo, é a única forma de proteção.

### Manifestações:

Podem não surgir sintomas (em 70% das mulheres e em 50% dos homens)

### Sintomas mais frequentes na mulher:

Alteração na quantidade, cheiro ou cor do corrimento vaginal; dor e ardência ao urinar, hemorragia entre os períodos menstruais.

### Sintomas mais frequentes no homem:

- Corrimento ligeiro pela uretra
- Dor e ardência ao urinar, dor nos testículos

### Exames necessários:

Deve procurar o seu Médico de Família ou Dermatologista para colher urina e corrimento para análise. Se tiver infeção por Clamídia, deve realizar análises para outras infeções de transmissão sexual

### O tratamento inclui:

- Antibiótico (azitromicina ou doxiciclina);
- Tratamento dos parceiros sexuais dos últimos 2 meses;
- Evitar sexo até terminar o tratamento e os sintomas desaparecerem.

### • Complicações se não tratada:

- Infeção dos testículos
- Dor abdominal crónica, Infertilidade
- Se grávida (infeção dos olhos e dos pulmões do bebé)
- Disseminação para outros órgãos (olhos e articulações)

**Se tratada a tempo, raramente origina complicações.**